

luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S43.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S43.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	16'717	12'649
dont cas avec diagnostic isolé	7'992	7'992

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	38.7	37.4
Age médian	38.4	35.9
Proportion des accidents professionnels	23%	24%
part des femmes	23%	23%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	4'436	2'234
Médiane des frais de traitement	1'278	889
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	127	98
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	12'716	5'317
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	59%	56%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	12'211	5'361
Médiane des prestations	2'205	1'500
10% des cas ont des prestations inférieures à	194	151
10% des cas ont des prestations supérieures à	27'131	13'283
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	67%	61%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	9'422	6'304
Part de cas avec indemnité journalière	56%	50%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	41	20
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	5	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	2	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	96	11
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	23%	18%
Somme des degrés d'invalidité par année	2'201%	203%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	2%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 5474 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S43XX en 2011-2015, dont 3357 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

Filter: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S43XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S43.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal