

lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S44.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	59	52
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.1	35.8
Age médian	34.7	38.8
Proportion des accidents professionnels	46%	43%
part des femmes	16%	17%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	16'138	9'124
Médiane des frais de traitement	7'336	4'251
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	96	96
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	40'913	14'384
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	58%	48%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	62'956	32'755
Médiane des prestations	13'177	10'725
10% des cas ont des prestations inférieures à	96	96
10% des cas ont des prestations supérieures à	96'640	40'520
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	73%	71%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	47	40
Part de cas avec indemnité journalière	79%	76%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	135	84
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	45	41



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	2
Part de cas avec IR	7%	4%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	2.1%	1.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	31%	25%
Somme des degrés d'invalidité par année	123%	49%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	11%	7%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 48 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S440_ en 2011-2015, dont 31 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S440_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal