

lésion traumatique du nerf axillaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S44.3_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	64	48
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.3	35.6
Age médian	36.5	36.5
Proportion des accidents professionnels	18%	14%
part des femmes	12%	14%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	28'042	19'203
Médiane des frais de traitement	14'877	9'612
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	2'184	2'184
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	59'815	46'862
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	46%	34%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	92'592	59'831
Médiane des prestations	16'792	15'936
10% des cas ont des prestations inférieures à	2'971	2'971
10% des cas ont des prestations supérieures à	204'346	131'645
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	63%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	56	40
Part de cas avec indemnité journalière	87%	83%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	164	125
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	77	59



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	2
Part de cas avec IR	7%	5%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	2.2%	1.3%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	33%	25%
Somme des degrés d'invalidité par année	143%	61%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	25%	17%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 93 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S443_ en 2011-2015, dont 52 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du nerf axillaire

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S443_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal