

Contusion du coude

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S50.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	11'398	7'223
dont cas avec diagnostic isolé	4'560	4'560

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.3	39.4
Age médian	41.4	40.5
Proportion des accidents professionnels	36%	41%
part des femmes	36%	30%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'810	908
Médiane des frais de traitement	430	326
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	82	76
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	3'542	1'825
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	67%	58%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	5'036	2'331
Médiane des prestations	774	472
10% des cas ont des prestations inférieures à	108	94
10% des cas ont des prestations supérieures à	9'148	4'820
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	74%	68%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	5'237	2'755
Part de cas avec indemnité journalière	46%	38%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	19	10
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	23	2
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	22%	16%
Somme des degrés d'invalidité par année	515%	35%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 3104 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S500_ en 2011-2015, dont 1819 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion du coude

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S500_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal