

fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S52.6X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S526.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	124	94
dont cas avec diagnostic isolé	56	56

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.9	41.3
Age médian	40.7	40.7
Proportion des accidents professionnels	19%	15%
part des femmes	48%	62%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	33'503	13'069
Médiane des frais de traitement	15'424	11'312
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	978	865
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	60'115	27'313
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	64%	34%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	67'248	31'130
Médiane des prestations	27'935	21'264
10% des cas ont des prestations inférieures à	4'880	2'662
10% des cas ont des prestations supérieures à	115'099	49'354
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	43%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	112	86
Part de cas avec indemnité journalière	90%	91%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	161	107
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	84	82

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	3	1
Part de cas avec IR	2%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.1%	0.3%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	44%	32%
Somme des degrés d'invalidité par année	132%	32%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	9%	6%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 89 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S526X en 2011-2015, dont 50 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S526X

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S526.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal