

luxation du coude, sans précision

filtre: Cas acceptés avec diagnostic S53.1

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	432	369
dont cas avec diagnostic isolé	148	148

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	42.8	42.7
Age médian	43.6	43.5
Proportion des accidents professionnels	21%	19%
part des femmes	35%	37%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	15'841	7'978
Médiane des frais de traitement	4'871	3'538
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	357	241
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	40'882	19'054
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	61%	49%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	41'619	21'575
Médiane des prestations	10'678	8'617
10% des cas ont des prestations inférieures à	592	456
10% des cas ont des prestations supérieures à	81'608	39'963
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	67%	57%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	327	265
Part de cas avec indemnité journalière	76%	72%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	103	73
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	47	40



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	11	4
Part de cas avec IR	3%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.8%	0.2%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	30%	20%
Somme des degrés d'invalidité par année	341%	72%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	9%	5%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 296 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S531_ en 2011-2015, dont 175 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

luxation du coude, sans précision

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S531_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal