

entorse et foulure du coude

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S53.4_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'532	1'181
dont cas avec diagnostic isolé	796	796

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	39.5	38.4
Age médian	40.8	39.5
Proportion des accidents professionnels	33%	33%
part des femmes	36%	33%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'465	787
Médiane des frais de traitement	459	383
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	86	69
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'911	1'767
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	62%	45%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	4'958	2'176
Médiane des prestations	751	603
10% des cas ont des prestations inférieures à	143	107
10% des cas ont des prestations supérieures à	9'466	4'655
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	76%	62%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	732	489
Part de cas avec indemnité journalière	48%	41%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	21	10
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	2	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	22%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	53%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 421 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S534_ en 2011-2015, dont 298 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

entorse et foulure du coude

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S534_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal