

## lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S54.0\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	140	110
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.0	36.2
Age médian	37.5	38.4
Proportion des accidents professionnels	50%	53%
part des femmes	33%	41%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	29'475	8'021
Médiane des frais de traitement	5'071	1'695
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	356	294
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	43'222	19'874
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	72%	50%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	71'177	23'579
Médiane des prestations	9'846	7'991
10% des cas ont des prestations inférieures à	995	414
10% des cas ont des prestations supérieures à	149'912	42'380
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	69%	62%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	104	74
Part de cas avec indemnité journalière	74%	67%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	175	90
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	43	21



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	5	1
Part de cas avec IR	4%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.1%	0.2%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	30%	15%
Somme des degrés d'invalidité par année	158%	18%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	11%	5%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 111 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S540\_ en 2011-2015, dont 58 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S540\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal