

luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S63.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S63.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	32'630	26'885
dont cas avec diagnostic isolé	21'416	21'416

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.2	36.7
Age médian	36.4	35.6
Proportion des accidents professionnels	28%	29%
part des femmes	37%	36%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'991	1'247
Médiane des frais de traitement	411	359
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	119	111
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	3'342	2'288
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	71%	65%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	5'781	3'713
Médiane des prestations	657	513
10% des cas ont des prestations inférieures à	138	129
10% des cas ont des prestations supérieures à	9'384	6'829
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	78%	76%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	13'629	10'178
Part de cas avec indemnité journalière	42%	38%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	22	16
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	83	43
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	25%	20%
Somme des degrés d'invalidité par année	2'127%	839%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 9286 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S63XX en 2011-2015, dont 7260 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S63XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S63.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal