

lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S64.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	157	109
dont cas avec diagnostic isolé	4	4

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	34.5	32.1
Age médian	32.0	29.1
Proportion des accidents professionnels	41%	47%
part des femmes	14%	8%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	10'502	5'733
Médiane des frais de traitement	5'468	4'000
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	571	541
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	22'694	10'963
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	50%	39%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	34'879	19'061
Médiane des prestations	12'165	9'539
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'194	955
10% des cas ont des prestations supérieures à	73'837	25'392
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	64%	56%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	133	93
Part de cas avec indemnité journalière	84%	85%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	109	74
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	62	48



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	1
Part de cas avec IR	3%	1%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.7%	0.3%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	24%	20%
Somme des degrés d'invalidité par année	104%	28%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	11%	5%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 120 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S640_ en 2011-2015, dont 53 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S640_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal