

lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S64.2_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	167	119
dont cas avec diagnostic isolé	4	4

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.0	37.6
Age médian	35.6	38.0
Proportion des accidents professionnels	46%	51%
part des femmes	19%	15%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	11'455	7'298
Médiane des frais de traitement	6'473	5'530
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	2'048	1'757
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	17'500	11'953
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	49%	38%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	38'803	29'103
Médiane des prestations	13'923	12'821
10% des cas ont des prestations inférieures à	6'308	4'112
10% des cas ont des prestations supérieures à	67'246	60'036
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	58%	56%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	162	115
Part de cas avec indemnité journalière	97%	97%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	140	111
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	78	45



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	5	3
Part de cas avec IR	3%	2%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.7%	0.5%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	25%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	113%	55%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	8%	6%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 111 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S642_ en 2011-2015, dont 63 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S642_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal