

lésion traumatique du nerf collatéral du pouce

Filter: Cas acceptés avec diagnostic S64.3_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	128	96
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.6	36.0
Age médian	37.5	36.6
Proportion des accidents professionnels	39%	36%
part des femmes	33%	30%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	8'177	6'770
Médiane des frais de traitement	5'689	4'330
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'862	1'273
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	13'419	11'781
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	42%	40%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	28'262	22'653
Médiane des prestations	10'138	8'626
10% des cas ont des prestations inférieures à	3'129	2'608
10% des cas ont des prestations supérieures à	34'860	29'647
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	60%	58%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	124	92
Part de cas avec indemnité journalière	97%	96%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	88	79
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	61	61



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	2
Part de cas avec IR	3%	3%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.7%	0.5%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	25%	23%
Somme des degrés d'invalidité par année	84%	50%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	6%	4%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 68 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S643_ en 2011-2015, dont 42 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du nerf collatéral du pouce

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S643_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal