

## lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S65.0\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	40	34
dont cas avec diagnostic isolé	0	0

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.7	38.3
Age médian	40.6	40.6
Proportion des accidents professionnels	52%	58%
part des femmes	23%	26%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	51'866	16'538
Médiane des frais de traitement	16'326	15'834
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	5'328	238
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	120'728	28'623
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	68%	39%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	115'113	58'315
Médiane des prestations	36'495	30'071
10% des cas ont des prestations inférieures à	5'328	238
10% des cas ont des prestations supérieures à	473'694	131'613
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	51%	63%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	32	26
Part de cas avec indemnité journalière	80%	76%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	251	166
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	97	97



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	3	2
Part de cas avec IR	6%	6%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	1.9%	1.4%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	29%	23%
Somme des degrés d'invalidité par année	76%	46%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	20%	17%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 50 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S650\_ en 2011-2015, dont 37 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S650\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal