

lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S66.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	282	174
dont cas avec diagnostic isolé	4	4

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.9	36.8
Age médian	36.3	36.3
Proportion des accidents professionnels	32%	33%
part des femmes	25%	26%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	14'637	6'453
Médiane des frais de traitement	5'689	4'107
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	1'114	471
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	17'500	16'022
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	62%	41%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	33'856	17'322
Médiane des prestations	14'385	11'563
10% des cas ont des prestations inférieures à	1'512	817
10% des cas ont des prestations supérieures à	57'439	39'495
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	61%	43%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	242	142
Part de cas avec indemnité journalière	86%	82%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	105	82
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	67	55



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	0
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.3%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	26%	21%
Somme des degrés d'invalidité par année	94%	8%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	5%	1%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 138 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S660_ en 2011-2015, dont 55 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S660_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal