

## Contusion de la cuisse

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S70.1\_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	5'320	2'909
dont cas avec diagnostic isolé	2'324	2'324

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.2	35.7
Age médian	35.8	32.9
Proportion des accidents professionnels	27%	32%
part des femmes	36%	27%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'887	810
Médiane des frais de traitement	345	240
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	57	48
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	3'014	1'177
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	73%	67%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	4'611	1'443
Médiane des prestations	612	341
10% des cas ont des prestations inférieures à	74	57
10% des cas ont des prestations supérieures à	6'254	2'537
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	80%	68%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	2'268	1'009
Part de cas avec indemnité journalière	43%	35%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	16	5
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	6	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	26%	18%
Somme des degrés d'invalidité par année	159%	7%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 1427 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S701\_ en 2011-2015, dont 732 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

## Contusion de la cuisse

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S701\_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal