

luxation du genou

filtre: Cas acceptés avec diagnostic S83.1

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	406	363
dont cas avec diagnostic isolé	228	228

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	35.7	34.8
Age médian	35.1	34.5
Proportion des accidents professionnels	14%	13%
part des femmes	37%	38%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	17'153	6'851
Médiane des frais de traitement	1'190	800
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	57	57
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	62'659	17'014
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	69%	67%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	37'055	13'763
Médiane des prestations	1'508	1'130
10% des cas ont des prestations inférieures à	66	62
10% des cas ont des prestations supérieures à	114'664	41'352
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	72%	73%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	186	143
Part de cas avec indemnité journalière	46%	39%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	83	40
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	7	1
Part de cas avec IR	2%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.6%	0.1%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	32%	24%
Somme des degrés d'invalidité par année	228%	24%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	6%	2%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 226 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S831_ en 2011-2015, dont 124 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

luxation du genou

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S831_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal