

lésion traumatique du tendon d'Achille

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S86.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	2'511	2'430
dont cas avec diagnostic isolé	1'716	1'716

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	44.5	44.5
Age médian	44.3	44.1
Proportion des accidents professionnels	20%	19%
part des femmes	17%	17%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	6'901	6'614
Médiane des frais de traitement	5'810	5'549
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	246	245
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	12'193	11'950
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	34%	33%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	17'571	16'501
Médiane des prestations	13'062	12'703
10% des cas ont des prestations inférieures à	433	429
10% des cas ont des prestations supérieures à	31'804	30'595
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	39%	38%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	1'875	1'802
Part de cas avec indemnité journalière	75%	74%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	61	56
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	37	36



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	4	3
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	22%	23%
Somme des degrés d'invalidité par année	94%	64%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 678 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S860_ en 2011-2015, dont 637 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique du tendon d'Achille

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S860_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal