

Contusion de la cheville

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S90.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	8'796	5'796
dont cas avec diagnostic isolé	5'184	5'184

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	34.5	33.3
Age médian	31.7	30.2
Proportion des accidents professionnels	31%	33%
part des femmes	32%	28%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'314	537
Médiane des frais de traitement	358	274
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	70	57
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'300	901
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	67%	53%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	3'855	1'302
Médiane des prestations	604	368
10% des cas ont des prestations inférieures à	108	80
10% des cas ont des prestations supérieures à	6'016	2'444
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	76%	62%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	4'115	2'228
Part de cas avec indemnité journalière	47%	38%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	16	6
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	10	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	31%	16%
Somme des degrés d'invalidité par année	297%	3%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 2314 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S900_ en 2011-2015, dont 1451 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

Contusion de la cheville

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S900_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal