

luxation d'un (des) orteil(s)

filtre: Cas acceptés avec diagnostic S93.1

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	427	357
dont cas avec diagnostic isolé	236	236

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.6	40.4
Age médian	42.9	41.8
Proportion des accidents professionnels	13%	11%
part des femmes	43%	45%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	4'807	928
Médiane des frais de traitement	476	364
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	126	112
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	7'222	1'300
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	86%	60%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	11'472	2'152
Médiane des prestations	796	499
10% des cas ont des prestations inférieures à	149	131
10% des cas ont des prestations supérieures à	16'422	4'573
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	85%	62%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	194	136
Part de cas avec indemnité journalière	46%	38%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	33	10
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	3	0
Part de cas avec IR	1%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.1%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	23%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	60%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	1%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 139 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S931_ en 2011-2015, dont 92 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

luxation d'un (des) orteil(s)

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S931_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal