

entorse et foulure de la cheville

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S93.4_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	58'891	52'560
dont cas avec diagnostic isolé	48'373	48'373

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	35.1	34.7
Age médian	33.2	32.7
Proportion des accidents professionnels	25%	25%
part des femmes	39%	38%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'132	799
Médiane des frais de traitement	447	417
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	103	93
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'847	1'477
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	59%	49%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	2'854	1'952
Médiane des prestations	795	698
10% des cas ont des prestations inférieures à	155	148
10% des cas ont des prestations supérieures à	5'381	4'119
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	65%	56%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	28'960	24'700
Part de cas avec indemnité journalière	49%	47%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	13	9
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	1	1
Nombre moyen de cas avec IR par année	22	5
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	21%	14%
Somme des degrés d'invalidité par année	459%	63%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 15097 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S934_ en 2011-2015, dont 13198 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

entorse et foulure de la cheville

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S934_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal