

entorse et foulure d'un (des) orteil(s)

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S93.5_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	3'209	2'696
dont cas avec diagnostic isolé	2'512	2'512

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.9	36.7
Age médian	35.0	34.8
Proportion des accidents professionnels	11%	11%
part des femmes	46%	44%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	470	267
Médiane des frais de traitement	216	203
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	57	57
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	544	454
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	60%	33%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	951	477
Médiane des prestations	247	227
10% des cas ont des prestations inférieures à	68	62
10% des cas ont des prestations supérieures à	1'481	1'052
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	70%	50%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	757	540
Part de cas avec indemnité journalière	24%	20%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	3	2
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	33%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	7%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 808 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S935_ en 2011-2015, dont 674 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

entorse et foulure d'un (des) orteil(s)

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S935_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal