

luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic S93.XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S93.

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	79'023	71'138
dont cas avec diagnostic isolé	62'129	62'129

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	35.5	35.0
Age médian	33.6	33.0
Proportion des accidents professionnels	24%	24%
part des femmes	40%	39%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'805	1'143
Médiane des frais de traitement	463	429
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	113	104
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'486	1'742
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	70%	61%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	4'442	2'748
Médiane des prestations	847	736
10% des cas ont des prestations inférieures à	155	148
10% des cas ont des prestations supérieures à	7'270	5'014
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	73%	66%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	39'461	33'713
Part de cas avec indemnité journalière	50%	47%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	18	12
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0

Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	4	2
Nombre moyen de cas avec IR par année	85	25
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	23%	19%
Somme des degrés d'invalidité par année	1'997%	481%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%



Extrapolation sur la base d'un échantillon de 21174 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) S93XX en 2011-2015, dont 18252 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied

Filter: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal S93XX

X représente un chiffre quelconque, y compris toutes les sous-catégories du code diagnostic S93.



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal