

lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic T13.0_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'592	724
dont cas avec diagnostic isolé	612	612

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	40.1	38.4
Age médian	40.3	38.2
Proportion des accidents professionnels	21%	19%
part des femmes	48%	49%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	1'204	337
Médiane des frais de traitement	259	158
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	29	0
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	2'512	543
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	71%	54%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	2'782	536
Médiane des prestations	291	187
10% des cas ont des prestations inférieures à	49	41
10% des cas ont des prestations supérieures à	4'108	1'242
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	81%	63%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	428	108
Part de cas avec indemnité journalière	27%	15%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	8	2
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	1	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	59%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	59%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 417 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) T130_ en 2011-2015, dont 181 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal T130_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal