

luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic T13.2_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	188	136
dont cas avec diagnostic isolé	136	136

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	37.6	35.0
Age médian	38.3	35.6
Proportion des accidents professionnels	34%	38%
part des femmes	28%	29%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	617	601
Médiane des frais de traitement	272	252
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	0	0
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	1'236	823
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	58%	63%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	1'910	2'086
Médiane des prestations	419	349
10% des cas ont des prestations inférieures à	0	65
10% des cas ont des prestations supérieures à	6'045	6'045
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	66%	70%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	68	60
Part de cas avec indemnité journalière	36%	44%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	11	10
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	0	0
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	-%	-%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	-%	-%
Somme des degrés d'invalidité par année	-%	-%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 47 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) T132_ en 2011-2015, dont 34 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal T132_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal