

corrosion de la cornée et du sac conjonctival

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic T26.6_

Nombre de cas par année	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Extrapolation du nombre de cas par année	1'616	1'531
dont cas avec diagnostic isolé	205	205

Socio-démographie	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Age moyen	36.4	36.3
Age médian	34.8	34.8
Proportion des accidents professionnels	82%	82%
part des femmes	28%	28%

Frais de traitement (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des frais de traitement	486	484
Médiane des frais de traitement	185	185
10% des cas ont des frais de traitement inférieurs à	64	64
10% des cas ont des frais de traitement supérieurs à	670	654
Part de ces 10% de cas par rapport au total des frais	61%	62%

Total des prestations d'assurance (en CHF)	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Moyenne des prestations	1'082	1'041
Médiane des prestations	194	194
10% des cas ont des prestations inférieures à	72	72
10% des cas ont des prestations supérieures à	1'163	1'071
Part de ces 10% de cas par rapport au total des prestations	80%	79%

Jours indemnisés	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre de cas avec indemnité journalière par année	231	214
Part de cas avec indemnité journalière	14%	14%
Moyenne des jours indemnisés (sans rentes)	2	2
Médiane des jours indemnisés (sans rentes)	0	0



Rentes	avec diagnostic	dont diagnostic principal (1)
Nombre moyen de cas avec décès par année	0	0
Nombre moyen de cas avec IR par année	1	1
Part de cas avec IR	0%	0%
Degré d'invalidité moyen (tous les cas)	0.0%	0.0%
Degré d'invalidité moyen (cas avec IR)	19%	19%
Somme des degrés d'invalidité par année	23%	19%
Cas avec indemnités pour atteinte à l'intégrité	0%	0%

Extrapolation sur la base d'un échantillon de 423 cas reconnus LAA avec diagnostic(s) T266_ en 2011-2015, dont 398 avec ce(s) diagnostic(s) comme diagnostic principal

(1) Pour les cas avec plusieurs diagnostics traumatiques, le diagnostic traumatique principal est celui dont les frais de traitement sont les plus élevés par rapport à la moyenne de tous les cas présentant ledit diagnostic.

corrosion de la cornée et du sac conjonctival

Filtre: Cas acceptés avec diagnostic traumatique principal T266_



(2) pour tous les cas avec diagnostic traumatique principal